

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00249	Estado: <input checked="" type="checkbox"/> Vigente	Fechas	Inscripción: 20/09/2017	Renovación:	Caducidad: 31/08/2023
Nombre Comercial: FLIPPER					

Titular

Alpha BioPesticides Limited

 St John's Innovation Centre

 CB4 0WS CowleyRoad
 (Cambridge)

 REINO UNIDO

Fabricante

Alpha BioPesticides Limited

 St John's Innovation Centre

 CB4 0WS CowleyRoad
 (Cambridge)

 REINO UNIDO

Composición

SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS C14-C20 48% [EW] P/V

Envases

Botellas de HDPE/EVOH, HDPE/PA, HPDE/PEHD y COEX de 1 L, 3 L, 5 L y 10 L.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Adormidera	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae, Oligonychus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

	Cochinillas harinosas, Pseudococcus spp.						Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae						Uso menor por jerarquía. Incluye Aleurothrixus floccosus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Aguacate	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha		Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros						Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae						Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp.. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae						Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Alfalfa	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha		Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros						Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae						Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae						Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Algodonero	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha		Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros						Exclusivamente para viveros. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae						Exclusivamente para viveros. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae						Exclusivamente para viveros. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Árboles y arbustos frutales	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha		Exclusivamente para viveros. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros						Uso menor por jerarquía. Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae						Uso menor por jerarquía. Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Arbustos frutales	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300-1000 l/ha		Uso menor por jerarquía. Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

	Ácaros					Se aplica en la fase seca del cultivo. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Se aplica en la fase seca del cultivo. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Se aplica en la fase seca del cultivo. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Arroz	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Se aplica en la fase seca del cultivo. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Batata, boniato	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Máximo 10 l/ha Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Myzus persicae, Macrosiphum sp, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Berenjena	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips, Frankliniella occidentalis	1 l/Hi	1-5	7 días	300-1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Tetranychus urticae, Aceria tulipae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Bulbos hortícolas	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinilla de la vid, Parthenolecanium corni					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Planococcus ficus y Planococcus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Conchita violeta, Parlatoria oleae					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Caqui	Trips	1 l/ha	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cebolla	Taladro del ajo, Dyspessa ulula	1 l/ha	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cebolleta	Taladro del ajo, Dyspessa ulula	1 l/ha	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale, tritordeum. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale, tritordeum. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale, tritordeum. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cereales de invierno / primavera	Trips	1 l/ha	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale, tritordeum. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii					
Cerezo	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus	1 l/ha	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye guindo. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye naranja, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Tetranychus urticae, Panonychus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye naranja, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Toxoptera auranti, Toxoptera citrici-dus, Aphis spiraecola (=Aphis citricola), ?phis fabae, Macrosiphum euphorbiae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Caparretas blancas, Ceroplastes spp.					Incluye naranja, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Ceroplastes sinensis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye naranja, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Trialeurodes vaporariorum, Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, Alerocanthus spiniferus, Parabemisia myricae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Piojo rojo de California, Aonidiella aurantii					Incluye naranja, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

Cítricos	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	500 - 2500 I/ha	Incluye naranja, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Selenothrips rubrocinctus, Heliothrips haemorrhoidalis, Pezothrips kellyanus. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Colza	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Myzus persicae, Macrosiphum sp., Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Cucurbitáceas de piel comestible	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Cucurbitáceas de piel no comestible	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Espárrago	Áfidos, pulgones, Aphididae	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Brachycorynella asparagi. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vainilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vainilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.

Especias e infusiones	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vainilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vainilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Espinacas y similares	Ácaros					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Nasonovia ribis-nigri, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Uroleucon sonchi, Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Psila del aliso, Psylla alni					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
Forestales y ornamentales leñosas	Ácaros					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
Fresal	Ácaros				300 - 1000 l/ha	Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae y Aphis gossypii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii				300 - 1000 l/ha	Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae				300 - 1000 l/ha	Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

	Ácaros					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Tetranychus urticae, Phytoptus avellanae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Aphis pomi, Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Myzus varians, Aphis gossypii, Myzus cerasi, Pterochloroides persicae, Hyalopterus amygdali, Aphis fabae, Sitobion fragariae, Aphis idaei, Aphis ruborum, Amphorophora rubi, Rhopalosiphoninus ribesinus, Appelia prunicola (=Brachycaudus prunicola). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcus spp.					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Pseudococcus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas, Coccidae					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Eulecanium tiliae, Parthenolecanium corni, Ceroplastes sinensis, Saissetia oleae, Coccus hesperidum, Sphaerolecanium prunastri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Piojos, Diaspididae					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Melanaspis sp., Pseudaulacaspis pentagona, Lepidosaphes ulmi, Melanaspis inopinata, Aeonidiella aurantii, Quadraspidiotus perniciosus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Frutales de cáscara	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye melocotonero, nectarino e híbridos, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Incluye Tetranychus urticae y Panonychus ulmi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye melocotonero, nectarino e híbridos, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Incluye Aphis pomi, Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Myzus varians, Aphis gossypii, Myzus cerasi, Pterochloroides persicae, Hyalopterus amygdali, Aphis fabae, Sitobion fragariae, Aphis idaei, Aphis ruborum, Amphorophora rubi, Rhopalosiphoninus ribesinus, Appelia prunicola (=Brachycaudus prunicola). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye melocotonero, nectarino e híbridos, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Frutales de hueso	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye melocotonero, nectarino e híbridos, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Tetranychus urticae y Panonychus ulmi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Aphis pomi, Myzus persicae, Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Eriosoma lanigerum, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Myzus varians, Aphis gossypii, Myzus cerasi, Pterochloroides persicae, Hyalopterus amygdali, Aphis fabae, Sitobion fragariae, Aphis idaei, Amphorophora rubi, Rhopalosiphoninus ribesinus, Appelia prunicola (=Brachycaudus Prunicola). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Psílidos, Psyllidae					Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Cacopsylla pyri, Cacopsylla mali, Cacopsylla picta, Cacopsylla melanoneura. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

Frutales de pepita	Trips	1 I/Hi	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp.. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Girasol	Trips	1 I/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Granado	Trips	1 I/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinilla de la vid, Parthenolecanium corni					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Planococcus ficus y Planococcus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Conchita violeta, Parlatoria oleae					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Guayabo	Trips	1 I/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.

Herbáceas extensivas	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-49.
	Ácaros					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosporium sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis Craccivora, Acyrthosiphon pisium, Acyrthosiphon sp. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci. BBCH 10-89.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Frankliniella occidentalis. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Caparretas blancas, Ceroplastes spp.					Uso menor por jerarquía. Incluye Ceroplastes sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Psila de la higuera, Homotoma ficus					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Higuera	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-49.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysime. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-49.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-49.
Hortalizas del género Brassica	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-49.
	Ácaros					Exclusivamente para semilleros de hortalizas. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-49.

	Áfidos, pulgones, Aphididae					Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
Hortícolas	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Algodón del olivo, tramilla, Euphyllura olivina					Uso menor por jerarquía. Incluye Euphyllura sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Flátidos, Flatidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Metcalfa sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Kiwi	Piojo de la morera, Pseudaulacaspis pentagona	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae, Panonychus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis citricidus, Toxoptera auranti, Toxoptera criticida, Aphis spiraecola (=Aphis criticola), Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Caparretas blancas, Ceroplastes spp.					Uso menor por jerarquía. Incluye Ceroplastes sinensis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Trialeurodes vaporariorum, Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, Alerocanthus spiniferus, Parabemisia myricae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Piojo rojo de California, Aonidiella aurantii					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Kumquat	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	500 - 2500 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Selenothrips rubrocinctus, Heliothrips haemorrhoidalis, Pezothrips kellyanus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Nasonovia ribis-nigri, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Uroleucon sonchi, Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.

Lechuga y similares	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-49.
	Ácaros					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Leguminosas de grano	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Leguminosas verdes (frescas)	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Lúpulo	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.

Maíz dulce	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Maíz	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Cochinilla de la vid, Parthenolecanium corni					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Planococcus ficus, Planococcus citri. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Conchita violeta, Parlatoria oleae					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Mango	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	500 - 2500 I/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Okra, quimbombo	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Aphis sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Algodón del olivo, tramilla, Euphyllura olivina					
	Calocoris trivialis					
	Caparreta negra, Saissetia oleae					
	Cochinilla globosa del olivo, Pollinia pollini					Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.

Olivo	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Piojos, Diaspididae					Incluye Leucaspis riccae, Aspidiotus nerii y Lepidosaphes ulmi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	500 - 2500 l/ha	Incluye Thripidae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Ornamentales herbáceas	Ácaros					Incluye begoña, ciclament, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agérato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye begoña, ciclament, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agérato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye begoña, ciclament, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agérato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye begoña, ciclament, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agérato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Papaya	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinilla de la vid, Parthenolecanium corni					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Planococcus ficus y Planococcus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Conchita violeta, Parlatoria oleae					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye praderas naturales, pastizales, praderas de siembra, gramíneas (prados de siembra) y polifitas (prados de siembra). Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye praderas naturales, pastizales, praderas de siembra, gramíneas (prados de siembra) y polifitas (prados de siembra). Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp.. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

Pastos y praderas	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye praderas naturales, pastizales, praderas de siembra, gramíneas (prados de siembra) y polifitas (prados de siembra). Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye praderas naturales, pastizales, praderas de siembra, gramíneas (prados de siembra) y polifitas (prados de siembra). Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Patata	Ácaros					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Pimiento	Ácaros					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Pinos	Ácaros					Incluye pino piñonero. Incluye Tetranychus urticae, Phytoptus avellanae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye pino piñonero. Incluye Aphis pomi, Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Myzus varians, Aphis gossypii, Myzus cerasi, Pterochloroides persicae, Hyalopterus amygdali, Aphis fabae, Sitobion fragariae, Aphis idaei, Aphis ruborum, Amphorophora rubi, Rhopalosiphoninus ribesi-nus, Appelia prunicola (=Brachycaudus prunicola). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcus spp.					Incluye pino piñonero. Incluye Pseudococcus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas, Coccidae					Incluye pino piñonero. Incluye Eulecanium tiliae, Parthenolecanium corni, Ceroplastes sinensis, Saissetia oleae, Coccus herperidum y Sphaerolecanium prunastri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye pino piñonero. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Piojos, Diaspididae					Incluye pino piñonero. Incluye Melanaspis sp., Pseudaulacaspis pentagona, Lepidosaphes ulmi, Melanaspis inopinata, Aeonidiella aurantii y Quadraspidiotus perniciosus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye pino piñonero. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinilla de la vid, Parthenolecanium corni					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Planococcus ficus y Planococcus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Conchita violeta, Parlatoria oleae					Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Piña Tropical	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Planococcus citri, Dysmicoccus grassii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aleurothrixus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Platanera	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp, Hercinothrips femoralis, Thrips florum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Puerro	Psila del aliso, Psylla alni	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Rábano	Psílidos, Psyllidae	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye rábano y rabanillo. Exclusivamente Psylla sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Raíces de achicoria (industrial)	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

	Ácaros					<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Ácaros					<p>Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Remolacha azucarera	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Ácaros					<p>Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum y Aleurocanthus spiniferus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Rosales	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Rúcula	Psila del aliso, Psylla alni	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Ácaros					<p>Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporarium. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>

Soja	Trips	1 l/ha	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Sorgo	Trips	1 l/ha	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus nicotianae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Tabaco	Trips	1 l/ha	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis y Thrips tabaci. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye espárrago, cardo, hinojo, apio, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye espárrago, cardo, hinojo, apio, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye espárrago, cardo, hinojo, apio, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Tallos jóvenes	Trips	1 l/ha	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye espárrago, cardo, hinojo, apio, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Máximo 10 l/ha Incluye Aculops lycopersici, Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Incluye Myzus persicae, Macrosiphum sp, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Tomate	Trips	1 l/ha	1-5	7 días	300-1000 l/ha	Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

	Ácaros					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Tetranychus urticae, Panonychus ulmi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cicadélidos, Cicadellidae					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Empoasca vitis y Scaphoideus titanus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Planococcus ficus y Pseudococcus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas, Coccidae					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Parthenolecanium corni y Pulvinaria vitis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Filoxera de la vid, Daktulosphaira vitifoliae					Incluye vid de mesa y para vinificación. Viteus vitifoliae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Metcalfa pruinosa					
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii					Incluye vid de mesa y para vinificación. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Aleurocanthus spiniferus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Vid	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
	Ácaros					Exclusivamente para viveros. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Exclusivamente para viveros. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Exclusivamente para viveros. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Árboles y arbustos frutales	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para viveros. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Uso en invernadero y uso protegido. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Uso en invernadero y uso protegido. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii					

Arbustos frutales	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300-1000 l/ha	<p>Uso menor por jerarquía. Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Uso en invernadero y uso protegido. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Ácaros					<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Máximo 10 l/ha Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Incluye Myzus persicae, Macrosiphum sp, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Berenjena	Trips, Frankliniella occidentalis	1 I/HA	1-5	7 días	300-1000 l/ha	<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Ácaros					<p>Exclusivamente para Espinaca, Lechuga, Brécol, Coliflor y Repollo. Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-49.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Exclusivamente para Espinaca, Lechuga, Brécol, Coliflor y Repollo. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. BBCH 10-49.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Exclusivamente para Espinaca, Lechuga, Brécol, Coliflor y Repollo. Incluye Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci. BBCH 10-49.</p>
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300-1000 l/ha	<p>Exclusivamente para Espinaca, Lechuga, Brécol, Coliflor y Repollo. Incluye Frankliniella occidentalis. BBCH 10-49.</p>
	Ácaros					<p>Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Tetranychus urticae, Aceria tulipae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Bulbos hortícolas	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Ácaros					<p>Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Myzus persicae, Macrosiphum sp., Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Cucurbitáceas de piel comestible	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>

	Ácaros					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cucurbitáceas de piel no comestible	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Endibia	Áfidos, pulgones, Aphididae	1 l/Hi	1-5	7 días	300-1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae. BBCH 10-49.
Espárrago	Áfidos, pulgones, Aphididae	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Brachycorynella asparagi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Espicias e infusiones	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Nasonovia ribis-nigri, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Uroleucon sonchi, Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Psila del aliso, Psylla alni					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
Espinacas y similares	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.

	Ácaros					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
Forestales y ornamentales leñosas	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	Ácaros				300 - 1000 l/ha	También en uso protegido. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					También en uso protegido. Incluye Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae y Aphis gossypii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii				300 - 1000 l/ha	También en uso protegido. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae				300 - 1000 l/ha	También en uso protegido. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Fresal	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	También en uso protegido. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
Herbáceas extensivas	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	Ácaros					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosporium sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis Craccivora, Acyrthosiphon pisium, Acyrthosiphon sp. BBCH 10-89.

	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci. BBCH 10-89.</p>
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Trips	1 I/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Frankliniella occidentalis. BBCH 10-89.</p>
	Ácaros					<p>Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysime. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Psílicos, Psyllidae					<p>Exclusivamente Psylla sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
Hortalizas del género Brassica	Trips	1 I/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Ácaros					<p>Exclusivamente para semilleros de hortalizas. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Exclusivamente para semilleros de hortalizas. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Exclusivamente para semilleros de hortalizas. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
Hortícolas	Trips	1 I/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Exclusivamente para semilleros de hortalizas. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Ácaros					<p>Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Nasonovia ribis-nigri, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Uroleucon sonchi, Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>

Lechuga y similares	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-49.
	Ácaros					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Leguminosas de grano	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Leguminosas verdes (frescas)	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
Okra, quimbombo	Trips	1 I/HA	1-5	7 días	300 - 1000 I/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.
	Ácaros					Incluye begonia, ciclament, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agérato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 I/ha. BBCH 10-89.

Ornamentales herbáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Pimiento	Ácaros					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Platanera	Ácaros					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Planococcus citri, Dysmicoccus grassii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					Uso menor por jerarquía. Incluye Aleurothrixus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp, Hercinothrips femoralis, Thrips florum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Rábano	Psíidos, Psyllidae	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye rábano y rabanillo. Exclusivamente Psylla sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89. BBCH 10-89.
	Ácaros					Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.

	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, apionabo, nabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Ácaros					<p>Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum y Aleurocanthus spiniferus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Rosales	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Rúcula	Psila del aliso, Psylla alni	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.</p>
	Ácaros					<p>Incluye espárrago, cardo, hinojo, apio, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye espárrago, cardo, hinojo, apio, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye espárrago, cardo, hinojo, apio, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Tallos jóvenes	Trips	1 l/Hi	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Incluye espárrago, cardo, apio, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Ácaros					<p>Máximo 10 l/ha Incluye Aculops lycopersici, Tetranychus urticae. BBCH 10-89.</p>
	Áfidos, pulgones, Aphididae					<p>Incluye Incluye Myzus persicae, Macrosiphum sp, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	Moscas blancas, Aleyrodidae					<p>Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Tomate	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips, Frankliniella occidentalis	1 l/Hi	1-5	7 días	300-1000 l/ha	<p>Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO

P.S. (días)

Adormidera, Aguacate, Alfalfa, Algodonero, Árboles y arbustos frutales, Arbustos frutales, Arroz, Batata, boniato, Berenjena, Bulbos hortícolas, Caqui, Cebolla, Cebolleta, Cereales de invierno / primavera, Cerezo, Cítricos, Colza, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Espárrago, Especies e infusiones, Espinacas y similares, Forestales y ornamentales leñosas, Fresal, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Girasol, Granado, Guayabo, Herbáceas extensivas, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Higuera, Hortalizas del género Brassica, Hortícolas, Kiwi, Kumquat, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Lúpulo, Maíz dulce, Maíz, Mango, Okra, quimbombo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Papaya, Pastos y praderas, Patata, Pimiento, Pinos, Piña Tropical, Platanera, Puerro, Rábano, Raíces de achicoria (industrial), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Rosales, Rúcula, Soja, Sorgo, Tabaco, Tallos jóvenes, Tomate, Vid, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Endibia

NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso



Aplicación por pulverización foliar de alto volumen manual o con tractor. Aplicar a los primeros síntomas de infestación. El producto debe de entrar en contacto directo con la plaga: es esencial cubrir las superficies de las hojas superiores e inferiores. En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para el correcto uso del producto. Los usos autorizados en invernadero o cultivo protegido para este producto han sido solicitados con anterioridad al 1 de junio de 2022, y por tanto no han sido evaluados de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de sistemas de cultivo, en consonancia con las conclusiones del Southern Member States Steering Committee (SMS SC) y los criterios de EFSA Journal 2014; 12(3): 3615

Clase de Usuario



Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

Tanto al aire libre como en invernadero: durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6, delantal PB3 o PB4 o C3 y calzado resistente a productos químicos y durante la aplicación, guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6 y calzado resistente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Tanto al aire libre como en invernadero, durante la reentrada se deberán utilizar ropa de trabajo adecuada o ropa de protección nivel C1, y calzado cerrado.

Normativa aplicable:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²).
- Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE EN 13832-2:2020.
- Ropa de protección C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

Medidas adicionales de mitigación para el operador:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.


- Al aire libre durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

Medidas adicionales de mitigación para el trabajador:

- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.



Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación ocular. Categoría 2. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.
Pictograma	 GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H319 -Provoca irritación ocular grave. H335 -Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de Prudencia	P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 3
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H412 -Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.

Mitigación de riesgos ambientales

Spe2: No aplicar en suelos drenados con pH > 7,5 y pendiente <0,5% en el caso de cítricos y patatas.
 Spe2: No aplicar en suelos drenados en el caso de alfalfa.
 Spe2: No aplicar en campos que presenten pendiente >4% en el caso de cereales de primavera y arroz.

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de:
 - 20 m con 10 m de cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 30% para frutales de pepita y hueso, frutales de cáscara.
 - 20 m con cubierta vegetal para cítricos, olivos, tabaco, patata, pimiento, tomate, berenjena, okra, cucurbitáceas de piel no comestible, soja, leguminosas verdes frescas, leguminosas de grano, maíz, remolacha azucarera, boniato, raíces y tubérculos, tallos jóvenes, espárrago, bulbos hortícolas, cebolla, cebolleta, hortalizas del género Brassica, cereales de invierno/primavera, arroz, sorgo, maíz, lechuga y similares, espinacas y similares, vid.
 - 10 m con cubierta vegetal para alfalfa.
 - 5 m para algodón, especias e infusiones, ornamentales herbáceas, rosales, forestales y ornamentales leñosas, colza, girasol, lúpulo, adormidera, raíces de achicoria (industrial), pastos y praderas, pinos, platanera, granado, mango, higuera, kiwi, kumquat, piña tropical, aguacate, guayabo, papaya, caqui.

SPe 8: No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo durante la floración y los períodos de producción de exudados. Si para polinizar se usan abejas, ciérranse las colmenas durante el tratamiento hasta que se seque el líquido pulverizado.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

Indicaciones que deben figurar en la etiqueta:

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Observaciones:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

Condiciones de almacenamiento

P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

